

Karta produktu

Agravita® Mo

PFC 1(C)(II)(a):

Prosty nieorganiczny nawóz mikroskładnikowy
mineralny nawóz mikroskładnikowy
w roztworze 4,4% Mo



Zadeklarowana zawartość składników pokarmowych w % (m/m):

4,4% Molibden (Mo) w postaci soli sodowej rozpuszczalnej w wodzie (= 47,5 g/l)

Składniki:

Molibdenian sodu dwuwodny (CAS: 10102-40-6)¹

¹CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

Postać:

Roztwór.

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 1080 g/l

pH (20°C): 6-10

Instrukcje dotyczące stosowania:

Opryskiwać rośliny za pomocą sprzętu i końcówek umożliwiających otrzymanie drobnych kropel, które zapewnią równomierne pokrycie roślin (oprysk drobnokroplisty). Zabieg opryskowy należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Zwrócić szczególną uwagę na warunki pogodowe w trakcie zabiegu. Nie wykonywać oprysku w dni suche, słoneczne, upalne oraz na powiędnione (odwodnione) rośliny. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. PRZED UŻYCIEM WYMIESZAĆ. Jeżeli zachodzi obawa co do zgodności, należy przeprowadzić próbę w oddzielnym naczyniu.

Skontaktuj się z firmą **CALDENА** lub jej dystrybutorem w celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń.

CALDENA

Zalecenia stosowania:

Rośliny uprawne	Dawka [l/ha]	Ilość wody [l/ha]	Liczba zabiegów	Termin stosowania
Zboża	0,2-0,3	200-300	2-3	Jesienią od fazy 2-3 liści. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do fazy dojrzałości młecznej ziarna.
Rzepak	0,3-0,7	200-300	2-3	Jesienią od fazy 4-6 liści. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do końca fazy zielonego pąka.
Kukurydza	0,3-0,5	200-300	1-2	Od fazy 4 liści do możliwości technicznej wykonania zabiegu.
Ziemniaki	0,3-0,5	200-300	1-2	Od pełnych wschodów do fazy intensywnego wzrostu bulw.
Buraki cukrowe	0,3-0,7	200-300	2	Od fazy 4 liści do fazy intensywnego przyrostu masy korzenia.
Bobowate	0,3-0,5	200-300	2-3	Od pełnych wschodów do fazy wypełniania strąków.
Warzywa	0,2-0,5	400-600	1-2	W początkowych fazach wzrostu.
Drzewa i krzewy owocowe	0,2-0,5	500-1000	1-2	W fazach intensywnego nawożenia azotowego.
Użytki zielone	0,3-0,5	200-300	1-2	Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji do września – 7-10 dni po pokosie/wypasie.
Fertygacja	Nawóz dozować z uwzględnieniem analizy wody i podłoża oraz wymagań pokarmowych roślin.			

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy. Przy dostaniu się produktu do oczu płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć wodą z mydłem i dobrze spłukać. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. W przypadku trwałego podrażnienia skóry zasięgnąć porady lekarza. Przy trwałych dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi.

Zalecane warunki przechowywania:

Nawóz należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od 0 do 30°C. Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych.

Informacje dodatkowe:

Zawiera również sód w postaci molibdenianu.

Dostępne opakowania:

5 l, 20 l

Deklaracja zgodności:

Dokumentacja potwierdzająca zgodność z przepisami UE jest dostępna na żądanie.



Producent:

CALDENA sp. z o.o.

Informacje przedstawione w niniejszej karcie produktu są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i informacji poprawne na moment ich opublikowania. Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania się oraz udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do określonego opisanego materiału i mogą być niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.



Zeskanuj kod QR

CALDENA Sp. z o.o.

ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnów, Poland
Masz pytania? Zadzwoń +48 800 100 000
www.caldena.com

Karta produktu Agravita Mo
Data sporządzenia: 20.11.2024
strona 2/2